

レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------|---|-------------|-----|
| 申請年月日 | 令和6年2月8日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 血液内科 | 申請医師 | 松永一美 | 化学療法委員会承認年月 | 年 月 |
| レジメン名 | APL204地固め療法 第1コース(MIT/Ara-C) | | | | |
| 疾患名 | 急性前骨髄球性白血病 | 適応の備考 | 寛解導入療法によりCRが達成された場合に地固め療法に進む。 | | |
| 適応分類 | 地固め療法 | | 原則的に好中球1,500/ μ L、白血球3,000/ μ L、血小板10万/ μ L 以上になれば開始する。 | | |
| 1コース日数 | 14 日間 | 総コース数 | 1 コース | 催吐性リスク | 軽度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 ノバントロン7mg/ m^2 day1-3、シタラビン(キロサイド)200mg/ m^2 day1-5 | | | | | |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) | | | | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | (day) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------------------|----------------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 側管 | グラニセトロン注 | 1 本 / body | 30 分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | バッグ1mg/50mL | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | 精密持続静注 | シタラビン(キロサイド)注 | 200 mg / m^2 | 24 時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 3 | 側管 | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 側管 | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ノバントロン注 | 7 mg / m^2 | 30 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 側管 | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | シタラビン(キロサイド)フラッシュ用 | / | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

シタラビン(キロサイド): 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトン点眼、1日3回、両眼、シタラビン投与前日から投与終了の翌日まで。