

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
登録診療科	血液内科		申請医師		
レジメン名	SMILE				
疾患名	悪性リンパ腫(NK/T)		適応の備考	閉鎖式	
適応分類					
1コース日数	28	日間	総コース数	コース	催吐性リスク   day1-4: 中等度、day8.10.12.14.16.18.20: 最小度
抗がん剤投与量・投与日	イホマイド1500mg/m <sup>2</sup> day2-4、マントレキセート 2000mg/m <sup>2</sup> day1、ロイナーゼ6000単位/m <sup>2</sup> day8.10.12.14.16.18.20、 エトボシド100mg/m <sup>2</sup> day2-4、デキサート注33mg(6.6mg×5A)day2-4				

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body	30分	●																											
2	主ルート	グラニセトン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30分	●																											
	点滴静注																															
3	主ルート	グラニセトン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30分	●	●	●																									
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body		●	●	●																									
4	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	マントレキセート注	2000 mg / m <sup>2</sup>	6時間	●																											
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	アイソボリン点滴静注 ロイコボリン注として15mg/body	7.5 mg / body	5分	●	●	●																									
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	エトボシド注	100 mg / m <sup>2</sup>	60分	●	●	●																									
7	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	イホマイド注	1500 mg / m <sup>2</sup>	2時間	●	●	●																									
8	側管	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	ウロミテキサソ注	300 mg / m <sup>2</sup>	5分	●	●	●																									
9	側管	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	ウロミテキサソ注	300 mg / m <sup>2</sup>	5分	●	●	●																									
10	側管	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	ウロミテキサソ注	300 mg / m <sup>2</sup>	5分	●	●	●																									
11	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	点滴静注																															
12	主ルート	生食500mL	1 本 / body									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	点滴静注	ロイナーゼ注 注射用水100mL	6000 単位 / m <sup>2</sup> 1 本 / body	2時間								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
13	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	点滴静注																															

【投与上の注意】

- 全身状態が十分でない患者には、減量が必要。
- 骨髄抑制と感染症を慎重に管理すること。
- ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- エトボシド: DEHPフリー点滴セット使用。