レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成25年10月1日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	上田　周二	化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	リツキサン(難治性自己免疫性貧血)				
疾患名	難治性自己免疫性貧血	適応の備考	リツキサンを繰り返し投与する場合は、原則として7日間以上あけて投与すること 総コース数は8コース(有効を確認すれば終了する)		
適応分類					
1コース日数	7　日間	総コース数	8　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキサン375mg/㎡ day1				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食50mL	1　本 / body	5　分	●						
	点滴静注		/								
			/								
2	主ルート	生食500mL	0.675　本 / ㎡		●						
	点滴静注	リツキサン注	375　mg / ㎡	下記	●						
			/								
	10倍に希釈する										
3	主ルート	生食50mL	1　本 / body	5　分	●						
	点滴静注		/								
			/								
	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3　錠 / body		●						
		ジクロフェナクNa錠25mg	1　錠 / body		●						
			/								
	リツキシマブ投与の30分前										

【投与上の注意】
リツキサン:前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキサン:初回はECGモニターをつける。
リツキサン:投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキサン:2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。