

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成	年	月
登録診療科	婦人科	申請医師					
レジメン名	イリノテカン+マイトマイシン						
疾患名	子宮がん・卵巣がん		適応の備考				
適応分類							
1コース日数	21	日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度	

抗がん剤投与量・投与日 || イリノテカン60mg/m² day1.8、マイトマイシン5mg/m² day1.8

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	投与日																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
1	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●																																		
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1	本 / body	30分	●																																		
2	主ルート	グラニセトン注ハック1mg/50mL	1	本 / body		●																																		
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3	本 / body	30分	●																																		
3	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●																																		
	点滴静注	イリノテカン注	60	mg / m ²	90分	●																																		
4	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●																																		
	点滴静注	マイトマイシン注	5	mg / m ²	60分	●																																		
5	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5分	●																																		
	点滴静注			/																																				

【投与上の注意】

- ・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。