レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 平成30年9月12日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 消化器内科・外科 | 申請医師 | 福永　睦 | 化学療法委員会承認年 | 平成　30 年　10 月 |
| **レジメン名** | アービタックス【初回】＋mFOLFOX6 | | | | |
| 疾患名 | 大腸がん | 適応の備考 | アービタックス初回患者の1コース目の計画登録にはこれを用いる。<br>アービタックスをすでに使用している2回目以降の患者、2コース目以降の登録には、アービタックス【2回目以降】+mFOLFOX6を使用すること。<br>CVポート | | |
| 適応分類 | 進行再発 | | | | |
| 1コース日数 | 14　日間 | 総コース数 | 有効な限り　コース | 催吐性リスク | 中等度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | アービタックス400mg/㎡ day1、オキサリプラチン85mg/㎡day1、5－FU400mg/㎡day1、5－FU2400mg/㎡day1(46時間持続) | | | | |

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 ( 投 与 日 は ● )　(day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬 剤 名 | 投 与 量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食20mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml | 1 本 / body | 15 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg/1mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | アービタックス | 400 mg / ㎡ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | アービタックス | 250 mg / ㎡ | 60 分 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | 生食100mL | 1 本 / body | 60 分 | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 主ルート | 5%ブドウ糖液250mL | 1 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | オキサリプラチン | 85 mg / ㎡ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp7とRp8を同時に投与開始する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 側管 | 5%ブドウ糖液250mL | 1 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | レボホリナート | 200 mg / ㎡ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp7とRp8を同時に投与開始する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | 5-FU | 400 mg / ㎡ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | 46 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈注射 | 5-FU | 2400 mg / ㎡ | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | 携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 希釈後の液量を総量140mLとなるよう調製 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | デカドロン錠 | 8 mg / body | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分2　朝昼食後 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

穿刺時に逆血を確認し、ポートの通過を確認すること

Rp7とRp8を同時に投与開始する。

day4のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる

デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday2～4の代わりに5HT3拮抗薬day2～4を追加する

オキサリプラチン：希釈は5%ブドウ糖液のみ。

アービタックス：希釈は生食のみ。

アービタックス：前投薬として、アービタックス投与前に、ポララミン注及びデキサート注が必要。

アービタックス：投与終了後は、infusion reactionを観察するため、1時間の観察時間が必要であり、単独投与の場合は初回アービタックス投与後生食100mLを1時間かけて滴下する。

アービタックス：投与速度は1回目のみ2時間、2回目以降1時間。

アービタックス：投与終了後は、本剤と同じ速度でラインを生食でフラッシュすること。

アービタックス：初回投与時は、400mg/㎡を2時間かけて投与、2回目以降は250mg/㎡を1時間かけて投与すること。