

レジメン登録フォーマット

|             |  |       |                  |
|-------------|--|-------|------------------|
| 申請年月日       |  | 使用開始日 | 平成27年1月1日        |
| 登録診療科       | 消化器内科・外科   | 申請医師  | 化学療法委員会承認 平成 年 月 |
| レジメン名       | FOLFIRI  |       |                  |
| 疾患名         | 大腸がん   | 適応の備考 | CVポート            |
| 適応分類        | 進行再発   |       |                  |
| 1コース日数      | 14 日間  | 総コース数 | コース 催吐性リスク 中等度   |
| 抗がん剤投与量・投与日 | イリノテカン150mg/m <sup>2</sup> day1、5-FU400mg/m <sup>2</sup> day1、2400mg/m <sup>2</sup> day1 |       |                  |

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名   | 投与量                      | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--------|---|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1   | 主ルート   | 生食20mL  | 1 本 / body               |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 |   |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2   | 主ルート   | 生食250mL   | 1 本 / body               | 30分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | ホスアプレピタント注150mg                                   | 1 本 / body               |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 3   | 主ルート   | ハロ/セロン注バッグ0.75mg50mL                              | 1 本 / body               | 30分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | デキサート注射液1.65mg/0.5mL                              | 3 本 / body               |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 4   | 主ルート   | 5%ブドウ糖液500mL                                      | 1 本 / body               | 90分  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | イリノテカン  | 150 mg / m <sup>2</sup>  |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     |        | Rp3とRp4を同時投与する                                    |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 5   | 側管     | 5%ブドウ糖液250mL                                      | 1 本 / body               | 2時間  | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | レボホリナート   | 200 mg / m <sup>2</sup>  |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     |        | Rp3とRp4を同時投与する                                    |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 6   | 主ルート   | 生食50mL  | 1 本 / body               | 5分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | 5-FU  | 400 mg / m <sup>2</sup>  |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 7   | 主ルート   | 生食100mL   | 1 本 / body               | 46時間 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|     | 中心静脈注射 | 5-FU<br>携帯型デイスポージブル注入ポンプ<br>希釈後の液量を総量140mLとなるよう調製 | 2400 mg / m <sup>2</sup> |      | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 8   |        |   |                          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

Rp3の後に抗がん剤投与すること

Rp4とRp5を同時投与する

・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。

・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。

・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。

Rp 7)の5-FU注は、携帯型デイスポージブル注入ポンプを使用して投与する。

穿刺時に逆血を確認し、ポートの通過を確認すること

・day1デキサート注は、3.3mgでも可