

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年11月12日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	岡田一幸
レジメン名	トラスツズマブ【初回】(胃がん)		
疾患名	胃がん	適応の備考	シスプラチン投与不可時、S-1またはカペシタピンを併用する 対象:HER2陽性胃がんのみ
適応分類	進行再発		S-1またはカペシタピン不可時は単剤で投与する
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース催吐性リスク軽度(トラスツズマブ単剤時は最小度)

抗がん剤投与量・投与日 || トラスツズマブ8mg/kg day1、カペシタピン2400mg~4200mg/body 分2もしくはS-1 80mg~120mg/body経口投与 day1夕食後-day15朝食後まで服用

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																					
	点滴静注		/																							
		ブライミング用	/																							
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body	90 分	●																					
	点滴静注	トラスツズマブ	8 mg / kg		●																					
		注射用水100mL	1 本 / body		●																					
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																										
3	側管	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																					
	点滴静注		/		●																					
		カペシタピン併用の場合	/																							
4	経口投与	カペシタピン	9999 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
		分2 医師の指示通り	/																							
		(体表面積) 1.36㎡未満 1回1200mg/body																								
		1.36~1.66㎡未満 1回1500mg/body																								
		1.66~1.96㎡未満 1回1800mg/body																								
	1.96㎡以上 1回2100mg/body																									
	day1夕食後-day15朝食後まで服用	/																								
4	経口投与	S-1併用の場合			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
		S-1	9999 mg / body																							
		分2 朝夕食後																								
		(体表面積) 1.25㎡未満 80mg/day																								
		1.25~1.5㎡未満 100mg/day																								
	1.5㎡以上 120mg/day																									
	day1夕食後-day15朝食後まで服用																									

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する

トラスツズマブの投与量は、初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg day1

トラスツズマブの投与時間は、初回投与90分、2回目以降は30分可

トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。