レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年10月27日	使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師	小西宗治	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	dose-dense　PTX				
疾患名	乳がん	適応の備考			
適応分類	術前術後補助化学療法				
1コース日数	14　日間	総コース数	4　コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	パクリタキセル175mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食20mL	1	本 / body		●													
	中心静脈注射			/															
				/															
2	主ルート	生食50mL	1	本 / body		●													
	中心静脈注射	デキサート注6.6mg	2	本 / body	30　分	●													
		デキサート注1.65mg	2	本 / body		●													
		ファモチジン注20mg	1	本 / body		●													
3	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●													
	中心静脈注射	パクリタキセル注	175	mg / ㎡	3　時間	●													
				/															
4	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●													
	中心静脈注射			/															
				/															
5		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg	1	本 / body			●												
	皮下注射			/															
				/															
	day1投与終了後24時間以降に投与　終了時間次第でday3に変更																		
		レスタミンコーワ錠	5	錠 / body		●													
	経口投与			/															
				/															
	パクリタキセル投与の30分前																		

【投与上の注意】
パクリタキセル：前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。
ペグフィルグラスチム：抗がん剤の投与開始14日前から投与終了後24時間以内に投与した場合の安全性は確立していない。