

レジメン登録フォーマット

申請年月日	使用開始日		
登録診療科	乳腺外科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【2回目以降】+イリノテカン2投1休		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 中等度

抗がん剤投与量・投与日 トラスツズマブ6mg/kg day1、イリノテカン100mg /㎡ day1.8

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																																		
	点滴静注		/	/																																			
ブライミング用																																							
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																		
	点滴静注	トラスツズマブ注射用水100mL	6 mg / kg	30 分	●																																		
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																							
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●																											
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1 本 / body	30 分	●							●																											
4	主ルート	グラニセトン注ハツグ1mg/50mL	1 本 / body		●							●																											
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3 本 / body	30 分	●							●																											
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●							●																											
	点滴静注	イリノテカン注	100 mg / ㎡	90 分	●							●																											
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●																											
	点滴静注		/	/																																			

【投与上の注意】

- ・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
 - ・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
 - ・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する
- トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
- トラスツズマブ: 初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。
- トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。