

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【初回】+カペシタピン(B)		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 最少度、カペシタピン:軽度
抗がん剤投与量・投与日 トラスツズマブ8mg/kg day1、カペシタピン3000~4800mg/body day1-14			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
	プライミング用																								
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	トラスツズマブ	8 mg / kg	90 分	●																				
		注射用水100mL	/		●																				
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																									
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
4		カペシタピン	下記錠 / body	朝夕 食後	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	経口投与		/																						
	1日2回朝夕食後 投与量は下記参照																								

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する
トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
トラスツズマブ初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。
トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。
カペシタピンの投与法はB法で行い、投与量は体表面積により決まる。
体表面積 1.33㎡未満 1回 1500mg/body(1日3000mg)
1.33㎡~1.57㎡未満 1回 1800mg/body(1日3600mg)
1.57㎡~1.81㎡未満 1回 2100mg/body(1日4200mg)
1.81㎡以上 1回 2400mg/body(1日4800mg) 朝夕食後に服用